

بررسی پراکنش فضایی ساقه‌خوارهای نیشکر در مزارع نیشکر جنوب استان خوزستان

حسین پریان^{*}، علی اصغر سراج^۱، علیرضا عسکریان زاده^۲ و عبدالامیر محیسینی^۴

^۱- نویسنده مسؤول: دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز (Parian_hp.2006@yahoo.com)

۲- دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

۳- استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران

۴- استادیار پژوهش ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد

تاریخ پذیرش: ۹۰/۷/۵

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۱/۱۸

چکیده

ساقه‌خوارهای نیشکر *Sesamia spp.* از آفات کلیدی نیشکر در استان خوزستان هستند که همه ساله خسارت سگینی به محصول نیشکر و شکر حاصله وارد می‌سازند. در این تحقیق، پراکنش فضایی جمعیت ساقه‌خوارها در سال ۱۳۸۷ در سه مزرعه ۲۵ هکتاری نیشکر، با واریته CP69-1062 واقع در جنوب شهرستان اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌برداری به صورت ماهیانه و طی هفت مرحله انجام گرفت. به منظور نمونه برداری و تخمین نسبی جمعیت آفت، از علائم خارجی خسارت آفت (به عنوان شاخص جمعیت) استفاده شد و تعداد ساقه و میان‌گره آلوده نیشکر در ایستگاه‌های نمونه‌برداری مورد نظر شمارش گردید. جهت تعیین نوع الگوی پراکنش فضایی آفت در این سه مزرعه، از شاخص‌های مختلف آمار کلاسیک استفاده شد. در همه مراحل نمونه‌برداری، مقادیر شاخص نسبت واریانس به میانگین، شاخص ازدحام‌کنکی و شاخص موریسیتا به طور معنی‌داری بیشتر از عدد یک و مقادیر شاخص‌های $K/1$ و شاخص گرین به طور معنی‌داری بیشتر از عدد صفر بودند. نتایج حاصل از همه شاخص‌ها نشان داد، الگوی پراکنش فضایی این آفت از نوع تجمعی می‌باشد. ضرایب رگرسیونی a تیلور و β آیوائو نیز به ترتیب $1/45 \pm 0/031$ و $1/18 \pm 0/065$ تعیین شد، به طوری که اختلاف معنی‌داری از عدد یک داشتند و هر دو بیانگر تجمعی بودن پراکنش فضایی آفت در تمام طول زندگی بود. براساس مقادیر R^2 و P به دست آمده از محاسبات رگرسیونی، شاخص آیوائو داده‌های پراکنش فضایی آفت را بهتر از شاخص تیلور برآذش نمود.

کلید واژه‌ها: پراکنش فضایی، ساقه‌خوارها، *Sesamia spp.*، نیشکر، خوزستان

نیشکر (پاییز و بهار)، در اثر تغذیه لاروها از ساقه‌های جوان، پوسیدگی در نقطه رشد گیاه به وجود می‌آید و عالیم خسارت بیشتر به صورت مرگ جوانه مرکزی^۱ نمایان می‌شود. همچنین در مراحل بعدی آلودگی (در طول عملیات داشت تا هنگام برداشت) لاروها، از ساقه‌های قابل آسیاب تغذیه کرده و باعث کاهش کمی و کیفی محصول می‌گردد. در ضمن، سوراخ‌های حاصل

مقدمه

یکی از آفات مهم در مناطق نیشکر کاری استان خوزستان، ساقه‌خوارهای نیشکر *Sesamia spp.* می‌باشند. ساقه‌خوارهای نیشکر اولین بار توسط دانیالی در سال ۱۳۵۵ از مزارع نیشکر هفت تپه جمع‌آوری شده و طبق تشخیص پازوکی به دو گونه *S. nonagrioides* و *S. creticia* Led. Lef. زاده، ۱۳۸۳). این دو گونه ساقه‌خوار در منطقه خوزستان دارای ۴-۵ نسل در سال می‌باشند. در مرحله اولیه رشد

Sesamia تاکنون مطالعه‌ای نشده است، ولی براساس منابع حاضر، به برخی مطالب موجود در مورد سایر ساقه‌خوارهای ذرت و نیشکر اشاره می‌شود: هال^۲ (۱۹۸۶)، ضمن تحقیقات خود در فلوریدا، در نتایج حاصل از بررسی آلدگی ساقه‌های نیشکر به آفت ساقه‌خوار *Diatraea saccharalis* Fabricius (Lep.: Crambidae) دریافت که پراکنش فضایی لارو آفت در تراکم جمعیتی بالا به صورت تجمعی می‌باشد. میقر و همکاران^۳ (۱۹۹۶)، با نمونه‌برداری و بررسی آلدگی مزارع نیشکر جنوب تگزاس، به ساقه‌خوار مکزیکی برج (*Eoreuma loftini* Dyar (Lep.: Crambidae)، الگوی پراکنش فضایی لاروهای کوچک آفت را تجمعی و لاروهای متوسط و بزرگ را تصادفی تشخیص دادند. ستامو و همکاران^۴ (۲۰۰۰)، در مزارع ذرت غرب آفریقا مطالعاتی روی آفت *Mussidia nigrivenella* (Lep.: Pyralidae) انجام داده و برای تفسیر داده‌ها و بررسی ارتباط بین میانگین و واریانس، قانون تیلور و شاخص آیوانو را به کار بردن. نتایج تحقیقات آن‌ها نشان داد شاخص تیلور بهتر از شاخص آیوانو داده‌ها را برآش می‌کند و براساس این شاخص، پراکنش فضایی آفت تجمعی گزارش شد. شکسنایدر و همکاران^۵ (۲۰۱۱)، در پی نمونه‌برداری از مزارع ۰/۶ تا ۲ هکتاری جنوب لویزیانا و بررسی درصد ساقه‌های آلوده به ساقه‌خوار نیشکر *D. saccharalis*، پراکنش فضایی لارو آفت را به صورت تصادفی به دست آوردند. اُرورک و هاچیسون^۶ (۲۰۰۳)، در آمریکا ضمن تخمین تراکم لاروهای ساقه‌خوار اروپایی ذرت *Ostrinia nubilalis* Hübner و کرم بلخوار ذرت *Boddie* در بلال‌های ذرت شیرین نزدیک *Helicoverpa zea*

2- Hall

3- Meagher *et al.*4- Setamou *et al.*5- Schexnayder *et al.*

6- O'Rourke & Hutchison

از تغذیه لاروها، محیط مناسبی برای فعالیت قارچ‌ها و میکرووارگانیسم‌های ساپروفیت بوده که این عوامل باعث اختلال در کیفیت محصول نیشکر گردیده و خسارت را تشدید می‌نمایند. به طور کلی، لاروهای ساقه‌خوار در طول سال در اثر تغذیه از ساقه‌های جوان و ساقه‌های قابل آسیاب، محصول نیشکر را به صورت معنی‌داری کاهش می‌دهند (عسکریان زاده، ۱۳۸۳؛ صیاد منصور و همکاران، ۱۳۸۳).

نمونه‌برداری از جمعیت‌ها به منظور شناسایی و تخمین تعداد گونه‌های موجودات زنده، اساسی‌ترین فعالیت در تحقیقات اکولوژی و مدیریت تلفیقی آفات (IPM) محسوب می‌گردد. در حقیقت، نمونه‌برداری و تصمیم‌گیری درباره آفت، اساس سیستم کنترل تلفیقی آفات می‌باشد. با نمونه‌برداری و آگاهی از نحوه پراکنش فضایی آفت، می‌توان به اطلاعات جامعی در مورد حضور یا عدم حضور آفت، طغیانی یا غیر طغیانی بودن آن، مهاجرت، تغذیه، تولید‌مثل، مرگ و میر، ساختار سنی، الگوی رشد جمعیت، تراکم و نحوه انتشار آفت دست یافت. به عبارت دیگر، هرچه پراکنش فضایی یک حشره را بهتر بشناسیم به همان نسبت، به روش مناسب‌تری خواهیم توانست ابعاد جمعیتی آن را در اکوسیستم اندازه‌گیری کنیم. بررسی نوع پراکنش فضایی آفت و عکس العمل دشمنان طبیعی آن، درک بهتری از روابط متقابل بین آنها فراهم می‌کند و این امر در مدیریت تلفیقی آفت می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد (رجی، ۱۳۸۷؛ پدیگو و بونتین، ۱۹۹۳).

از آنجائی که استقرار و پخش گلنی نسل‌های مختلف ساقه‌خوارها، در سطح گسترده و متراکم مزارع نیشکر متفاوت می‌باشد، بنابراین انجام عملیات نمونه‌برداری و آگاهی از نحوه پراکنش فضایی آن‌ها می‌تواند دانش ما را در بهبود کنترل طبیعی و کنترل بیولوژیک آفت افزایش دهد. در ارتباط با اجرای برنامه نمونه‌برداری و تعیین نوع الگوی پراکنش فضایی ساقه‌خوارهای نیشکر جنس

1- Pedigo & Buntin

در این رابطه N تعداد نمونه، D دقت آزمایش، S انحراف معیار نمونه، m میانگین نمونه و $Z_{\alpha/2}$ از جدول مربوطه به دست می‌آید که با در نظر گرفتن 0.1 برای α ، مقدار آن برابر $1/96$ می‌گردد (هسو و همکاران^۲، 2001). ضمن انجام بررسی مذکور، با توجه به پراکندگی گسترده آفت در سطح مزارع 25 هکتاری و لزوم افزایش دقت نمونه‌برداری، تعداد نمونه مورد نیاز جهت نمونه‌برداری از سه مزرعه آزمایشی، با در نظر گرفتن $D=15$ ، $N=121$ نمونه به دست آمد.

موقعیت 121 ایستگاه نمونه‌برداری از طریق انتخاب 11 خط کاشت نیشکر 250 متری در طول 1000 متری ضلع‌های شمالی و جنوبی هر مزرعه (به فواصل یکسان 100 متری) و متعاقباً روی هر یک از این خطوط در عمق مزرعه، تعداد 11 ایستگاه نمونه‌برداری به فواصل مساوی 25 متر از یکدیگر، در نظر گرفته شد.

۲- زمان نمونه‌برداری

عملیات نمونه‌برداری از سطح مزارع انتخابی، در هفت مرحله به صورت ماهیانه، در آغاز هر ماه، و در فاصله‌ی زمانی $1/2$ تا $1/8$ آغاز 1387 انجام گرفت.

۳- نحوه انجام عملیات نمونه‌برداری

با توجه به این که شکل‌شناسی و خسارت دو گونه ساقه خوار (*S. nonagrioides* و *S. cretica*) در مزارع نیشکر، بسیار شبیه به هم بوده و امکان تفکیک آن‌ها به ویژه در شرایط صحراوی میسر نبود، بنابراین در این تحقیق، تراکم جمعیت و پراکنش‌فضایی آن‌ها به صورت ترکیبی از دو گونه، موردنبررسی قرار گرفت. از طرفی با توجه به محدودیت دسترسی به حشرات کامل ساقه‌خوار و همچین به علت استقرار و فعالیت سنین مختلف لاروی آن‌ها درون ساقه‌های نیشکر، امکان شمارش مستقیم آفت میسر نبود، بنابراین به منظور تخمین نسبی جمعیت آفت، از علائم خارجی خسارت لاروهای آفت در ساقه‌های آلدده، به عنوان "شاخص

زمان برداشت، پراکنش‌فضایی هر یک از دو آفت را با استفاده از شاخص تیلور به ترتیب به صورت تصادفی و یکنواخت تعیین نمودند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه پراکنش و الگوی پراکنش‌فضایی ساقه‌خوارهای *Sesamia spp.* طی یک دوره عملیات داشت در مزارع نیشکر می‌باشد تا اطلاعات به دست آمده از این تحقیق، در برنامه مدیریت تلفیقی آفت مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روش‌ها

کلیه بررسی‌های مربوط به این تحقیق، کاملاً تحت شرایط صحراوی و در سطح سه مزرعه 25 هکتاری نیشکر (جمعاً 75 هکتار)، مربوط به اراضی شرکت کشت و صنعت دعیل خوزاعی (یکی از شرکت‌های هفت‌گانه تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، واقع در 25 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در امتداد ساحل شرقی رودخانه کارون انجام گرفت.

سن مزارع نیشکر انتخابی، بازرسی اول^۱ بود. مزارع نیشکر انتخابی، زیر کشت واریته CP69-1062 (که نسبت به سایر ارقام نیشکر به آفت حساس‌تر است) و دارای پوششی نسبتاً یکنواخت با بوته‌هایی به ارتفاع حدود $20-15$ سانتی متر بودند.

۱- تعیین تعداد واحدهای نمونه‌برداری

به منظور تعیین تعداد نمونه مورد نیاز، متناسب با دقت مورد نظر از لحاظ آماری، همان‌جا با شروع فعالیت و ظهور علائم خسارت آفت (مشاهده مرگ جوانه مرکزی در بوته‌های جوان نیشکر) در اوایل فروردین، ابتدا چند نمونه‌برداری مقدماتی^۲ در مزارع آزمایشی انجام گرفت و تعداد نمونه لازم با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$N = \left(\frac{Z_{\alpha/2}}{D} \right)^2 \cdot \left(\frac{S}{m} \right)^2$$

1- Ratoon 1

2- Pilot sampling

تصادفی می‌باشد. در این راستا، مقدار میانگین و واریانس جمعیت در هر مرحله نمونه‌برداری محاسبه و در رابطه فوق قرار داده شد. اگر این نسبت به طور معنی‌داری با عدد یک اختلاف نداشته باشد، جمعیت به طور تصادفی پراکنده شده است و چنانچه بیشتر و کمتر از عدد یک باشد. پراکنش به ترتیب تجمعی و یکنواخت خواهد بود. سپس جهت آزمون انحراف از عدد یک، مقدار شاخص پراکندگی^۲ (ID) از طریق رابطه زیر محاسبه شد:

$$ID = \frac{(N-1)S^2}{\bar{X}}$$

که در رابطه فوق S^2 واریانس، \bar{X} میانگین و N تعداد کل واحدهای نمونه‌برداری است. در مرحله بعد با توجه به این که تعداد واحدهای نمونه‌برداری در هر مرحله نمونه‌گیری، بیش از ۳۰ عدد بود، مقدار عددی Z از طریق رابطه زیر محاسبه شد:

$$Z = \sqrt{2(ID)} - \sqrt{2(N-1)-1}$$

برای تعیین نوع پراکنش آفت، چنانچه رقم Z بین +۱/۹۶ و -۱/۹۶ باشد، نوع پراکنش تصادفی، اگر بیشتر از +۱/۹۶ باشد، پراکنش تجمعی و درصورتی که کمتر از -۱/۹۶ باشد از پراکنش یکنواخت پیروی می‌کند (رجی، ۱۳۸۷).

۲-۴ شاخص K در توزیع دو جمله‌ای منفی
این شاخص، وارون پارامتر K در توزیع دوجمله‌ای منفی بوده و به عنوان شاخصی برای تعیین نوع پراکنش فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{1}{K} = \frac{S^2 - \bar{X}}{\bar{X}^2}$$

در این رابطه: S^2 واریانس نمونه و \bar{X} میانگین حسابی می‌باشد. چنانچه مقدار $\frac{1}{K}$ برابر صفر گردد، پراکنش

جمعیت^۱ استفاده گردید. در این راستا، اولین نمونه‌برداری از ۳۶۳ ایستگاه انتخابی در سه مزرعه آزمایشی، پس از ظهور علائم مرگ جوانه انتهایی در بوته‌های کوتاه و علفی نیشکر، در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ صورت گرفت. در این مرحله، ضمن حرکت در مسیر خطوط کاشت نیشکر و یافتن موقعیت ایستگاه‌های نمونه‌برداری، با قراردادن کادر فلزی U شکل به ابعاد ۱ در ۵/۰ متر روی خطوط کاشت نیشکر (به عنوان واحد نمونه‌برداری)، تعداد ساقه‌های آلوده در محدوده کادر شمارش گردید. با توجه به شbahت علائم خسارت آفت در ابتدای خرداد ماه، نمونه‌برداری دوم نیز به همین طریق صورت گرفت.

با گذشت زمان و متناسب با رشد و تغییرات فنولژیکی بوته‌های نیشکر (ساقه‌دهی)، علائم خسارت لاروهای آفت، نسبت به حالت قبل تغییر یافت و به صورت ایجاد سوراخ‌های متعدد در سطح میانگره‌های ساقه‌های آلوده نمایان شد. بنابراین، برای تخمین نسبی جمعیت آفت در ایستگاه‌های انتخابی، شیوه نمونه‌برداری در مراحل بعدی، در مقایسه با دو نمونه برداری ابتدایی، تغییر نمود. در این زمان، در هر ایستگاه تعداد ۱۰ ساقه نیشکر (به عنوان واحد نمونه‌برداری) به صورت تصادفی از بین بوته‌های مجاور هر ایستگاه، انتخاب و توسط قمه نی‌بری از سطح خاک قطع گردید. سپس ضمن جدا نمودن کلیه برگ‌ها و غلاف‌های روی ساقه، اقدام به بررسی ساقه‌ها و شمارش تعداد میانگره‌های سالم (فاقد سوراخ) و آلوده (دارای یک یا چند سوراخ) گردید.

۴- تعیین الگوی پراکنش فضایی آفت با استفاده از شاخص‌های آمار کلاسیک

۴-۱ شاخص نسبت واریانس به میانگین
ساده‌ترین شاخص پراکنش، نسبت واریانس به میانگین (S^2/\bar{X}) بوده که آزمون مناسبی برای پراکنش

$$I_\delta = n \frac{\sum X_i(X_i - 1)}{N(N-1)}$$

در این رابطه: N تعداد کل افراد حشره مورد بررسی است که در n واحد نمونه‌برداری دیده می‌شوند و X_i تعداد حشره موجود در واحد نمونه‌برداری (i آم) است. براساس این شاخص، چنانچه I_δ برابر با یک گردد، الگوی پراکنشی تصادفی و درصورتی که بیشتر و کمتر از یک محاسبه گردد، نوع پراکنش به ترتیب، تجمعی و یکنواخت معروفی می‌شود (رجی، ۱۳۸۷). همچنین، به منظور تأیید نتایج حاصل از بررسی شاخص I_δ موریسیتا، مقدار عددی فرمول $N - n + 1$ ($N-1$) محاسبه شد. در این فرمول اگر رقم حاصله، از رقم جدول مربع کای با درجه آزادی $n-1$ کوچک‌تر بود، پراکنش تصادفی و درصورت بزرگ‌تر بودن، نوع پراکنش آفت تجمعی در نظر گرفته شد (موریسیتا، ۱۹۵۴).

۴-۶ روش‌های رگرسیونی تیلور^۵ و آیوائو^۶

در این تحقیق، برای تکمیل اطلاعات، علاوه بر کاربرد شاخص‌های پراکنش آمار کلاسیک برای هر یک از دوره‌های نمونه‌برداری، به منظور بررسی الگوی کلی پراکنش جمعیت ساقه‌خوارهای نیشکر *Sesamia spp.* در سال ۱۳۸۷، با به دست آوردن ۲۱ جفت میانگین و واریانس از جمعیت آفت (طی هفت مرحله نمونه‌برداری در سه مزروعه آزمایشی)، از دو مدل ریاضی تیلور و آیوائو استفاده و ضرایب مربوطه محاسبه شدند. در این راستا، به منظور انتخاب مدل مناسب، پارامتر ضریب تبیین مورد استفاده قرار گرفت.

الف-شاخص b در قانون تیلور

بر اساس قانون تیلور، بین میانگین و واریانس جمعیت در یک محیط، رابطه زیر برقرار می‌باشد:

$$S^2 = a\bar{x}^b$$

تصادفی و چنانچه بیشتر و کمتر از صفر شود به ترتیب پراکنش تجمعی و یکنواخت می‌باشد (رجی، ۱۳۸۷).

۳-۴ شاخص ازدحام لکه‌ای^۱

شاخص ازدحام لکه‌ای که به صورت IP بیان می‌شود، علاوه بر تعیین نوع پراکنش، بیان گر میزان تجمع جمعیت نیز می‌باشد که با افزایش تجمع، میزان IP که از رابطه زیر محاسبه می‌گردد، افزایش خواهد یافت:

$$IP = 1 + \frac{S^2}{\bar{X}^2} - \frac{1}{\bar{X}}$$

در این رابطه: S^2 واریانس نمونه و \bar{X} میانگین حسابی می‌باشد. چنانچه میزان شاخص IP برابر یک گردد، نوع پراکنش تصادفی و چنانچه بیشتر و کمتر از یک باشد، پراکنش به ترتیب تجمعی و یکنواخت خواهد بود (رجی، ۱۳۸۷).

۴-۴ شاخص گرین^۲

شاخص گرین با علامت اختصاری C_x ، که شاخص دیگری برای تعیین نوع پراکنش فضایی آفت بود، از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$C_x = \frac{\left(\frac{S^2}{\bar{X}}\right) - 1}{N-1}$$

که در این رابطه: S^2 واریانس نمونه، \bar{X} میانگین حسابی و N تعداد کل واحدهای نمونه‌برداری است. چنانچه مقدار این شاخص برابر با صفر باشد، الگوی پراکنش، تصادفی و چنانچه بیشتر و کمتر از صفر به دست آید، پراکنش آفت مورد نظر به ترتیب، تجمعی و یکنواخت می‌باشد (رجی، ۱۳۸۷).

۵-۴ شاخص پراکنش موریسیتا^۳

شاخص موریسیتا (I_δ) که بر اساس تنوع تعداد حشره در واحد نمونه‌برداری ارائه شده است، از رابطه زیر محاسبه گردید:

4- Morisita

5- Taylor's power law

6- Iwao index

1- Index of Patchiness

2- Green's Index

3- Morisita's Index of Dispersion

همانند شاخص b تیلور، مقادیر بزرگتر، مساوی و کوچک تر از عدد یک برای β به ترتیب نشان دهنده پراکنش های تجمعی، تصادفی و یکنواخت می باشد (تسای و همکاران، ۲۰۰۰).

برای آزمون معنی دار بودن اختلاف ضرایب b تیلور و آیوانو با عدد یک، از آماره t در رابطه زیر استفاده شد:

$$t = (\text{slope} - 1) / \text{SE}_{\text{slope}}$$

مقدار t محاسبه شده با مقدار t جدول با درجه آزادی $n-1$ مورد مقایسه قرار گرفت. چنانچه قدر مطلق مقدار t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، در آن صورت اختلاف ضرایب با عدد یک معنی دار خواهد بود (تسای و همکاران، ۲۰۰۰).

نتایج و بحث

نتایج بررسی داده های حاصل از هفت مرحله نمونه برداری ماهیانه از جمعیت ساقه خوارهای نیشکر در سه مزرعه آزمایشی و محاسبه مقادیر شاخص های مختلف پراکنش جمعیت، در جداول های ۱، ۲ و ۳ نشان داده شده است.

مقادیر کلیه شاخص های مورد نظر بیش از عدد معیار هر شاخص بوده که این بیان گر تجمعی بودن پراکنش فضایی ساقه خوارهای نیشکر طی هر یک از مراحل نمونه برداری بود.

بررسی شاخص های تیلور و آیوانو برای کل دوره زندگی آفت نشان داد شبیه خط رگرسیون در هر دو مدل به طور معنی داری از عدد یک بزرگتر است (جدول ۴). بنابراین همانند نتایج حاصل از مطالعه سایر شاخص های مختلف پراکنش در آمار کلاسیک، مشخص گردید الگوی پراکنش فضایی ساقه خوارها در مزارع نیشکر ۲۵ هکتاری به صورت تجمعی می باشد. همچنین براساس مقادیر ضرایب تبیین به دست آمده، مدل آیوانو ($R^2 = 0.9863$) در مقایسه با مدل تیلور ($R^2 = 0.9634$) همبستگی بیشتری با داده ها داشته و بهتر از شاخص تیلور، داده های

که در این رابطه s^2 واریانس، \bar{X} میانگین، a و b برخلاف دو مؤلفه قبلی معادله که متغیر می باشند، ثابت هستند (دماؤندیان و اصغری جعفر آبادی، ۱۳۸۶). به منظور محاسبه مقادیر a و b ، بین لگاریتم واریانس ها به عنوان متغیر وابسته و لگاریتم میانگین ها به عنوان متغیر مستقل، رابطه رگرسیونی به شرح زیر برقرار گردید:

$$\text{Log}(s^2) = \text{Log}(a) + b \text{Log}(\bar{X})$$

در رابطه فوق: پارامتر b یا شبیه خط رگرسیون، به عنوان شاخص پراکنش تیلور معرفی می گردد. در صورتی که b بزرگتر، مساوی یا کوچک تر از یک باشد، توزیع فضایی آفت به ترتیب تجمعی، تصادفی یا یکنواخت خواهد بود (یاماورا^۱، ۲۰۰۸).

پارامتر a با گرفتن آنی لوگ از عرض از مبدأ معادله رگرسیون خطی ($\text{Log}(a)$) به دست می آید. بزرگ بودن پارامتر a در مدل تیلور نشان دهنده بالا بودن درجه تجمعی آفت است (بلانک^۲ و همکاران، ۲۰۰۰).

ب-شاخص آیوانو

بر اساس قانون آیوانو، بین شاخص میانگین انبوهی^۳ (\bar{x}) و میانگین جمعیت آفت (\bar{X})، رابطه رگرسیونی زیر برقرار می باشد:

$$x^* = \alpha + \beta \bar{x}$$

شاخص میانگین انبوهی با استفاده از رابطه زیر به دست می آید (۱۲):

$$x^* = \bar{x} + \left(\frac{s^2}{\bar{x}} - 1 \right)$$

در معادله رگرسیونی آیوانو پارامتر β (ضریب زاویه خط رگرسیون) همان شاخص تجمع است که رفتار آن مانند پارامتر b تیلور می باشد. همچنین عرض از مبدأ این معادله (α) نیز به عنوان شاخصی برای تعیین درجه انبوهی جاندار به کار می رود، به طوری که مقدار منفی آن بیان گر وجود نیروی دافعه بین موجودات زنده می باشد (سات وود، ۱۹۷۸).

1- Yamarmura

2- Blank *et al.*

3- Lloyds mean crowding index

این آفت را برآش نمود. بنابراین برای برآورد نوع پراکنش جمعیت آفت مناسب تر به نظر می‌رسد.

جدول ۱- مقادیر شاخص‌های مختلف پراکنش ساقه‌خوارهای نیشکر طی مراحل مختلف نمونه‌برداری در مزرعه شماره یک

نوع پراکنش	I_δ	C_X	IP	$1/k$	Z	مرحله نمونه برداری
تجمیعی	۱/۵۵	۰/۰۱۴	۱/۵۵	۰/۴۸	۹/۹۴	اول
تجمیعی	۱/۴۲	۰/۰۰۶	۱/۱۴	۰/۱۴	۴/۵۲	دوم
تجمیعی	۲/۱۰	۰/۰۰۸	۲/۱۰	۲/۰۸	۶/۱۴	سوم
تجمیعی	۱/۵۴	۰/۰۲۷	۱/۹۷	۰/۰۷	۱۶/۵۹	چهارم
تجمیعی	۱/۴۲	۰/۰۶۳	۱/۴۲	۰/۰۳	۲۹/۸۹	پنجم
تجمیعی	۱/۲۷	۰/۰۸۱	۱/۲۷	۰/۰۳۱	۳۵/۳۳	ششم
تجمیعی	۱/۱۸	۰/۰۹۵	۱/۲۳	۰/۰۲۳	۳۹/۲۲	هفتم

جدول ۲- مقادیر شاخص‌های مختلف پراکنش ساقه‌خوارهای نیشکر طی مراحل مختلف نمونه‌برداری در مزرعه شماره دو

نوع پراکنش	I_δ	C_X	IP	$1/k$	Z	مرحله نمونه برداری
تجمیعی	۱/۶۶	۰/۰۲۱	۱/۶۶	۰/۰۴	۱۳/۴۲	اول
تجمیعی	۱/۱۱	۰/۰۰۱	۱/۰۶	۰/۰۶	۲/۹۱	دوم
تجمیعی	۲/۹۲	۰/۰۰۴	۲/۹۱	۱/۹۱	۵/۲۵	سوم
تجمیعی	۲/۳۸	۰/۰۰۷	۲/۴۱	۱/۴۱	۱۷/۸۳	چهارم
تجمیعی	۱/۵۵	۰/۰۶۰	۱/۵۵	۰/۰۴۱	۳۰/۹۵	پنجم
تجمیعی	۱/۲۵	۰/۰۶۴	۱/۲۵	۰/۰۲۹	۳۳/۰۸	ششم
تجمیعی	۱/۲۱	۰/۰۶۵	۱/۱۸	۰/۰۱۶	۳۶/۵۹	هفتم

جدول ۳- مقادیر شاخص‌های مختلف پراکنش ساقه‌خوارهای نیشکر طی مراحل مختلف نمونه‌برداری در مزرعه شماره سه

نوع پراکنش	I_δ	C_X	IP	$1/k$	Z	مرحله نمونه برداری
تجمیعی	۱/۳۵	۰/۰۱۱	۱/۳۵	۰/۰۳۷	۸/۱۴	اول
تجمیعی	۱/۳۰	۰/۰۰۴	۱/۲۷	۰/۰۲۷	۳/۵۲	دوم
تجمیعی	۳/۲۷	۰/۰۲۲	۳/۲۳	۲/۲۳	۷/۲۶	سوم
تجمیعی	۲/۶۲	۰/۰۶۲	۲/۵۴	۱/۰۵۴	۱۹/۴۶	چهارم
تجمیعی	۱/۶۷	۰/۰۶۷	۱/۶۷	۰/۰۴۹	۳۴/۲۲	پنجم
تجمیعی	۱/۳۰	۰/۰۶۹	۱/۳۰	۰/۰۳۶	۳۱/۷۴	ششم
تجمیعی	۱/۱۶	۰/۰۷۱	۱/۱۸	۰/۰۱۹	۳۹/۲۰	هفتم

پریان و همکاران: بررسی پراکنش فضایی ساقه خوارهای نیشکر...

جدول ۴- آماره‌های رگرسیونی مدل‌های تیلور و آیوائو برای بررسی الگوی کلی پراکنش فضایی جمعیت ساقه خوارها در مزارع نیشکر کشت و صنعت دِبَل خُزاعی در سال ۱۳۸۷

مدل برآذش شده	شب خط رگرسیون $b \pm SE$	عرض از مبدأ $a \pm SE$	مقدار t محاسبه شده	تعداد سری داده‌ها	ضریب تعیین R^2
تیلور	$1/45 \pm 0/065$	$0/31 \pm 0/066$	۶/۹۴ **	۲۱	۰/۹۶۳۴
آیوائو	$1/18 \pm 0/031$	$2/36 \pm 0/092$	۵/۹۹ **	۲۱	۰/۹۸۶۳

** نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین شب خط رگرسیون با عدد بک در سطح احتمال ۱٪ می‌باشد

(۱۹۸۶)، لاروهای کوچک ساقه خوار برنج مکزیکی *Eoreuma loftini* Dyar در مزارع نیشکر جنوب تگزاس (میقر و هماران، ۱۹۹۶) و ساقه خوار *Mussidia nigrivenella* Ragonot در مزارع ذرت غرب آفریقا به صورت تجمعی گزارش شده‌اند (ستامو و همکاران، ۲۰۰۰). همچنین نتایج برخی از محققین، مغایر با نتایج فوق به دست آمده است که علت آن عمدتاً به وجود اختلاف در شرایط اکولوژیکی، گیاه میزبان، نوع و ویژگی‌های رفتاری آروآفت و ... برمی‌گردد. برای مثال: پراکنش فضایی لارو آفت ساقه خوار نیشکر *D. saccharalis* در مزارع جنوب لویزیانا به صورت تصادفی (شکستنایدر و همکاران، ۲۰۰۱)، لاروهای ساقه خوار اروپایی ذرت *Ostrinia nubilalis* Hübner و کرم بلال خوار ذرت *Helicoverpa zea* Boddie آمریکا به ترتیب به صورت تصادفی و یکنواخت گزارش شده‌اند (اروک و هاچیسون، ۲۰۰۳).

به طور کلی عوامل متعددی در شکل‌گیری الگوی پراکنش فضایی حشرات آفت موثر است که می‌توان به شرایط تولیدمثل، الگوی تخم‌گذاری، خروج نوزادان از یک دسته تخم یا جمع شدن نوزادان در اطراف والدین)، خصوصیات اجتماعی شدن (از جفت شدن جنسی گرفته تا حالات اجتماعی پیشرفته)، تغذیه (واکنش به مواد غذایی)، خصوصیات رفتاری مراحل نابالغ، فرمون‌های تجمعی، کایرومون‌های میزبان، انبوهی گونه میزبان،

با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی می‌توان به این نتیجه کلی رسید که محاسبه‌ی شاخص‌های پراکنش، روش ساده‌ای برآورده‌ای برای برآورد نوع پراکنش فضایی جمعیت ساقه خوارها بوده و داده‌ها و محاسبات لازم برای برآورده آنها معمولاً زیاد نمی‌باشد. همچنین شاخص‌های b تیلور و β آیوائو پراکنش جمعیت آفت را به صورت کلی و در طول فصل زراعی نشان داده و قادر به تعیین پراکنش جمعیت آفت در یک تاریخ معین نمونه‌برداری و همچنین روشن نمودن روند تغییرات آن در طول فصل زراعی نمی‌باشد. در صورتی که به کمک سایر شاخص‌های آمار کلاسیک می‌توان در هر تاریخ نمونه‌برداری چگونگی پراکنش جمعیت را تخمین زده و روند تغییرات پراکنش آفت در طول یک فصل را نشان داد. بنابراین اگر هدف نمایش الگوی تغییر و پراکنش جمعیت در طول زمان باشد، شاخص‌های پراکنش بر دو شاخص تیلور و آیوائو ترجیح داده می‌شوند.

همان‌گونه که عنوان گردید، در ارتباط با تعیین الگوی پراکنش فضایی گونه‌های ساقه خوار نیشکر (*Sesamia* spp.) گزارشی در دسترس نیست. اما در این راستا، مطالعات محدودی در ارتباط با بررسی نحوه پراکنش سایر ساقه خواران نیشکر و ذرت از نقاط مختلف دنیا گزارش شده است که نتایج برخی از آن‌ها با نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. برای مثال: پراکنش فضایی لارو *Diatraea saccharalis* ساقه خوار نیشکر *Fabricius* در تراکم جمعیتی بالا در فلوریدا (هال،

توزیع آفت، دستجات تخم می‌باشد. و چون تخم‌ها به صورت توده گذاشته می‌شوند طبیعتاً حالت تجمعی هم خواهد داشت. همچنین لاروهایی که از آن‌ها خارج می‌شوند، تغذیه خود را به صورت گروهی و دسته‌جمعی آغاز و خسارت آن‌ها در سطح مزرعه به صورت تجمعی مشاهده می‌گردد. بنابراین تجمعی بودن الگوی پراکنش ساقه‌خواران نیشکر به نحوه تخم‌گذاری و خصوصیت رفتاری مراحل بالغ و نابالغ آفت که عمدتاً تحت تأثیر تغییرات عوامل غیر زنده، میزان یکنواختی و کیفیت گیاه میزبان در قسمت‌های مختلف مزارع نیشکر می‌باشند، بر می‌گردد.

نتایج حاصل از این تحقیق که پراکنش فضایی ساقه‌خوارهای نیشکر را برای اولین بار در ایران مشخص نموده است، زمینه طراحی مدل‌های نمونه‌برداری برای پیش‌آگاهی سریع، کم هزینه و دقیق جمعیت ساقه‌خوارهای *Sesamia* spp. در مزارع نیشکر را فراهم خواهد نمود.

کارآبی دشمنان طبیعی، عوامل غیرزنده (مانند نور، حرارت، رطوبت و ...)، میزان یکنواختی و کیفیت گیاه میزبان اشاره نمود (پدیگو و بونتین، ۱۹۹۳).

در تئوری تجمع، تجمع تخم‌ها یکی از شرایط مهم با هم زیستن افراد یک گونه، محسوب می‌شود که در این میان نقش حشرات ماده دارای اهمیت بالایی است. در همین مورد دیده می‌شود که توده‌های تخم بعضی از حشرات به شکل تصادفی گذاشته می‌شوند در حالی که چون به صورت توده گذاشته می‌شوند، لاروهایی که از آن‌ها خارج می‌شوند به صورت تجمعی در سطح مزرعه مشاهده می‌شوند. در همین راستا گهگاه دیده می‌شود که لاروهای حاصل از این تخم‌های کپه‌ای، به تدریج پراکنده شده و پراکنی تصادفی را به وجود می‌آورند (دماؤندیان و اصغری جعفر آبادی، ۱۳۸۶).

در حشراتی مانند ساقه‌خوارهای نیشکر جنس *Sesamia* که تخم‌گذاری آن‌ها به صورت دسته‌ای صورت می‌گیرد، پدیده با هم زیستن تقویت می‌گردد. به عبارتی عامل اولیه برای شکل‌گیری نوع

منابع

۱. دماوندیان، م. ر. و اصغری جعفر آبادی، م. ۱۳۸۶. آمار کاربردی برای مدیریت آفات. انتشارات دانشگاه مازندران. ۴۰۰ ص.
۲. رجبی، غ. ۱۳۸۷. اکولوژی حشرات با توجه به شرایط ایران و با تأکید بر نکات کاربردی. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی. چاپ دوم: ۶۴۸ ص.
۳. صیاد منصور، ع.، شیرالی، ع.، سردارازاده، ن. و علیقلی کهیش، ا. ۱۳۸۳. بررسی میزان خسارت حشرات ساقه‌خوار *Sesamia* spp. در واریته‌های تجاری نیشکر. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه تبریز. جلد اول. ص ۳۹۲.
۴. عسکریان زاده، ع. ۱۳۸۳. ارزیابی مکانیسم‌های مقاومت ارقام نیشکر به ساقه خواران (Lep.: Noctuidae). رساله دوره دکتری. حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. ۱۲۸ ص.
5. Blank, R.H., Gili, G.S.C., McKenna, C.E., and Stevens, P.S. 2000. Enumerative and binomial sampling plans for armored scale (Homoptera: Diaspididae) on kiwifruit leaves.

Journal of Economic Entomology, 93(6):1752-1759.

6. Feng, M.G., and Nowierski, R.M. 1992. Spatial distribution and sampling plans for four species of cereal aphids (Homoptera: Aphididae) infesting spring wheat in southwestern Idaho. Journal of Economic Entomology, 85(3): 830-837.
7. Hall, D.G. 1986. Sampling for the sugarcane borer (Lepidoptera: Pyralidae) in sugarcane. Journal of Economic Entomology, 79: 813-816.
8. Hsu, J.C., Horng, S.B., and Wu, W.J. 2001. Spatial distribution and sampling of *Aulacaspis yabunikkei* (Homoptera: Diaspididae) in camphor trees. FAO Plant Protection Bulletin, 43: 69-81.
9. Meagher, R.L., Wilson, L.T., and Pfannenstiel, R.S. 1996. Sampling *Eoreuma loftini* (Lepidoptera: Crambidae) on Texas sugarcane. Environmental Entomology, 25: 7-16.
10. Morisita, M. 1954. Estimation of population density by spacing method. Memoirs of Faculty of Science, Kyushu University, 1: 187-197.
11. O'Rourke, P.K., and Hutchison, W.D. 2003. Sequential sampling plans for estimating European corn borer (Lepidoptera: Crambidae) and corn earworm (Lepidoptera: Noctuidae) larval density in sweet corn ears. Crop Protection, 22 : 903-909.
12. Pearsall, I., A., and Myers, J.H. 2000. Evaluation of sampling methodology for determining the phenology, relative density, and dispersion of western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) in Nectarine Orchards. Journal of Economic Entomology, 93(2):494-502.
13. Pedigo, L.P., and Buntin, G.B. 1993. Handbook of Sampling Methods for Arthropods in Agriculture. CRE PRESS, 705 p.
14. Schexnayder, H.P., Reagan, T.E., and Ring, D.R. 2001. Sampling for the sugarcane borer (Lepidoptera : Crambidae) on sugarcane in Louisiana. Journal of Economic Entomology, 94: 766-771.
15. Setamou, M., Schulthess, F., Poehling, H.M., and Borgemeister, C. 2000. Spatial distribution of and sampling plans for *Mussidia nigrivenella* (Lepidopter: Pyralidae) on cultivated and wild host plants in Benin. Environmental Entomology, 29: 1216- 1225.
16. Southwood, T.R.E. 1978. Ecological Methods, with Practicular Reference to the Study of Insect Populations. 2nd ed, Chapman & Hall, London, 524 p.
17. Tsai, J.H., Wang, J.J., and Liu, Y.H. 2000. Sampling of *Diaphorina citri* (Homoptera: Psyllidae) on orange jassamine in southern Florida. Florida Entomologist, 83(4): 446-459.
18. Yamamura, K. 2000. Colony expansion model for describing the spatial distribution of populations. Population Ecology, 42: 161-169.